

VYBRANÉ ASPEKTY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE O PACIENTY SE ZAVEDENÝM PERMANENTNÍM MOČOVÝM KATÉTREM

Zdeňka Knechtová

17. 5. 2017

Co bude obsahem sdělení?


- Indikace k zavedení permanentního močového katétru
- Typy katétrů ke katetrizaci močového měchýře
- Zavádění permanentního močového katétru
- Péče o pacienty se zavedeným permanentním močovým katétrem
- Problémové oblasti v péči o permanentní močový katétr
- Navrhovaná řešení

Indikace k zavedení PMK

- Inkontinence moči
- Nutnost hodnocení bilance tekutin
- Sledování hodinové diurézy
- Opakované výplachy močového měchýře
- Operační výkony (nejen na močovém aparátu)
- Pacienti v bezvědomí aj.

Typy katétrů

Katétry pro muže – Tiemannův katétr



Katétry pro ženy – Nelatonův katétr



Postup při zavedení PMK

- Kompetence dle Vyhlášky č. 55/2011 Sb.
- Spolupracující pacient vs. neklidný pacient
- Strach a úzkost pacientů před zavedením katétru

Zavádění permanentního močového katétru

- Příprava pacienta
- Příprava prostředí a pomůcek
- Octenisept, Skinsept mucosa
- Samotné zavedení katétru
- Přísně asepticky
- Vždy dvě sestry

Péče o permanentní močový katétr

- Rozpojování systému
- Odběry moči přes port
- Fixace katétru
- Prevence zalomení katétru
- Prevence refluxu moči
- Prevence poranění močové trubice při zavádění i v následné péči
- **Aseptický přístup**
- Ponechat co nejkratší možnou dobu
- Provádět kontrolní odběry moči
- Dbát na hygienickou péči
- Hodnocení charakteru a množství moči
- Hodnocení známek lokální i celkové infekce



Problémové oblasti v péči o permanentní močové katétry

Nedostatečná hygienická péče

Parafimoza

- Nedostatečná hygienická péče

Problémové oblasti v péči o permanentní močové katétry

- Nespolupracující pacienti
- Nešetrné zavedení
- Nevhodná fixace katétru

Problémové oblasti v péči o permanentní močové katétr

- Nesprávná manipulace a uložení katétru



Problémové oblasti v péči o permanentní močové katétry

- Infekce močových cest
- Katetrizace je příčinou infekcí až v 80 % případů
- Neaseptický přístup při katetrizaci
- Znovuzavádění kontaminovaných pomůcek
- Chybný postup dezinfekce před katetrizací
- Chybná nebo nedostačující dezinfekce rukou
- Rozpojování systému
- Riziko vzniku infekce při vyprazdňování sběrných sáčků do močových lahví či džbánů

Navrhovaná preventivní opatření

- Vzdělávat sestry v péči o permanentní katétr
- Nácvik katetrizace močového měchýře
- Vytvoření standardů ošetrovatelské péče určených ke katetrizaci močového měchýře vč. dalších výkonů spojených s péčí o tyto katétr
- Aktivní vyhledávání nových informací a jejich implementace do klinické praxe
- Zajištění dostatečného množství potřebných pomůcek
- Edukace spolupracujících pacientů se zavedeným močovým katétrem
- Multioborová spolupráce

Děkuji za pozornost!

